

La criocirugía y la queratosis actínica

Queratosis actínicas se consideran lesiones precancerosas. No hay ninguna garantía que cancerosos, sin embargo tienen el potencial. A menudo el médico les eliminará con nitrógeno líquido, también conocido como criocirugía. Este es el tratamiento con la aplicación de una sustancia fría, (congelación). En la mayoría de los casos esto destruye la lesión. De 14 a 48 horas después del tratamiento, el área puede costra y o desarrollar una ampolla. Puede haber una sensación de ardor o dolor que puede durar hasta 24 horas. Las molestias pueden aliviarse con Tylenol o un medicamento similar para el dolor. En dos o tres semanas, la costra debe caerse y el área debe ser resuelto. Si cualquier lesión permanece, o no es piel recomendamos que vuelve a nosotros para una biopsia revise o posible.

Instrucciones para el cuidado

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Limpiar los sitios de la ampolla con agua y jabón, enjuague y luego secarlas.
3. Aplique un ungüento antibiótico (Bacitracin, Polysporin o vaselina).
4. Un curita se puede aplicar libremente sobre la ampolla hasta que se seque.
5. Llame a nuestra oficina producirse signos de infección (enrojecimiento, hinchazón, calor, aumento de dolor o descarga amarillo).