

## **Botox/Dysport instrucciones**

### **Uso**

Las inyecciones de Botox se utilizan para la mejora de las líneas finas y arrugas causadas por envejecimiento, herencia, gravedad, daño del sol y acción muscular.

### **Riesgo y complicaciones**

Los efectos secundarios experimentados por los pacientes que han tenido las inyecciones de Botox son:

dolor de cabeza, moretones, dolor durante las inyecciones, asimetría (un lado diferente de la otra), fasciculaciones, entumecimiento y parálisis temporal de los párpados o las cejas.

### **Embarazo**

Pacientes que creen que pueden ser o están embarazadas no deben tener las inyecciones de Botox.

### **Interacciones de la droga**

Pacientes que están tomando aminos glucósido, antibióticos, penicilamina, quinina y calcio bloqueadores de los canales deben hablar con su M.D. antes de la inyección de Botox.

### **Tratamiento**

Una inyección de una cantidad muy pequeña de Botox en el músculo específico causa debilidad y parálisis de ese músculo. Esto resulta en la relajación del músculo y mejora de las líneas que se ha formado la acción muscular.

Esta respuesta es generalmente vistos 2-6 días después de la inyección. Por lo general, la acción muscular volverá en 3-5 meses y se puede hacer un tratamiento de repetición.

### **Cuidados postoperatorios**

Estacia erecto; no se acueste durante por lo menos 4 horas.

No masajee la zona.

Durante la siguiente hora, entrecerrar los ojos y levantar la medida de lo posible de la zona de la ceja.